

RECOLTE ISSARBE le 24/08/2014

GENRE	ESPECE	SOUS-ESPECE	NOM VERNACULAIRE	OBSERVATIONS	DESRIPTIF
Agaricus	silvaticus		Agaric des forêts		chair blanche à rosissement vineux pâle
Albatrellus	cristatus		Polypore craquelé		chapeau jaune verdâtre craquelé - pores blancs fins décurrents
Amanita	excelsa		Amanite élevée		pas d'odeur de rave - chapeau brun foncé parsemé de traces vélaïres grisâtres - anneau tenace - stipe à base bulbeuse
Amanita	muscaria	formosa	Amanite tue-mouche var. formosa		chapeau orangé à jaune doré avec petites squamules jaunes régulières
Amanita	pachyvolvata		Amanite à volve épaisse		volve blanche charnue, très engageante - pas d'anneau - chapeau brillant brun à marge fortement striée sans squame
Amanita	rubescens		Amanite rougissante = vineuse = Golmotte		chapeau brun rosé ponctué de restes vélaïres - lames et stipe tachés de rose vineux - chair rougit aux blessures
Amanita	spissa		Amanite épaisse		odeur de rave - anneau strié, tenace - chapeau brun foncé parsemé de traces vélaïres grisâtres - stipe à base bulbeuse
Boletus	aestivalis		Cèpe d'été	+	ressemble à B.edulis mais chapeau à revêtement mat - stipe entièrement réticulé de blanchâtre sur fond roussâtre
Boletus	calopus		Bolet à beau pied	+	chapeau blanchâtre - pores jaune vif nettement bleuissants - stipe réticulé jaune en haut et rouge en bas - chair amère
Boletus	edulis		Cèpe de Bordeaux		chapeau à revêtement un peu lubrifié avec liseré blanchâtre à la marge - stipe peu réticulé
Boletus	erythropus		Bolet à pied rouge		chapeau brun chatain - pores rouge sang - stipe pointillé de rouge (non réticulé) - bleuissant
Boletus	subappendiculatus		Bolet des sapins (presque appendiculé)		sous conifères - chapeau brun - pores jaune vif non bleuissants - stipe ventru crème à jaune - chair jaune non bleuissante
Calocera	viscosa		Calocère visqueuse		sur conifères - corail jaune ramifié
Cantharellus	amethysteus		Girolle améthyste		girolle à reflets violets (squames) sur le chapeau
Cantharellus	friesii		Girolle abricot		petite girolle à couleurs vives (rouge rosé) - odeur d'abricot
Cantharellus	tubaeformis		Chanterelle en tube		chapeau ombiliqué brun jaune - hyménium à plis bien formés jaunes à gris argenté - stipe creux jaune vif - en troupes
Chalciporus	piperatus		Bolet poivré		base pied jaune vif - saveur poivrée
Clavulina	cristata		Clavaire à crêtes		clavicules branchues, blanches
Clitocybe	clavipes		Clitocybe à pied en massue		chapeau mou gris jaunâtre - stipe en massue, mou à la base
Clitocybe	costata		Clitocybe côtelé		chapeau brun ochracé à marge crénelée - odeur cyanique à fruitée
Clitocybe	phaeoptalma		Clitocybe à odeur de poulailler		chapeau à marge flexueuse striée - odeur de poulailler ou de plume mouillée
Clitopilus	prunulus		Meunier		chapeau mat blanchâtre - lames décurrentes rosées à maturité - odeur et saveur forte de farine
Collybia	aquosa		Collybie aqueuse		stipe bulbeux - mycélium rosâtre (différences avec C.dryophila)
Collybia	confluens		Collybie confluyente		en touffes - lames très serrées blanchâtres - stipe typique sillonné ou comprimé à prune gris lilas - odeur coumarinique
Conocybe	tenera		Conocybe délicat		chapeau campanulé, strié, brun fauvâtre - lames et stipe ochracés
Cortinarius	albviolaceus		Cortinaire blanc violet		en forme de casque anglais - chapeau, stipe et chair bleu lilacin pâle
Cortinarius	cinnabarinus		Cortinaire rouge cinabre		chapeau, lames et stipe rouge minium - chair orangé
Cortinarius	hinnuleus		Cortinaire couleur de faon		chapeau mammelonné "couleur de faon" hygrophane - lames espacées concolores - stipe avec anneau médian blanc membraneux - odeur forte terreuse
Creolophus	cirrhatous		Créolophe ondulé		chapeaux blancs imbriqués sans pied - aiguillons allongés et serrés
Cystoderma	cinnabarinum		Cystoderme rouge cinabre		chapeau rouge brique - stipe à armille floconneuse
Entoloma	caccabus				chapeau brun à marge striée, en entonnoir - odeur et saveur farineuses
Entoloma	nidorosum		Entolome nitreux		odeur forte nitrée ou chlorée
Fomes	fomentarius		Amadouvier		en forme de sabot de cheval - pores gris très fins
Fomitopsis	pinicola		Polypore marginé		gros sabot à croûte résineuse brun-orange-noir, odeur forte "bizarre"
Galerina	marginata		Galère marginée		chapeau hygrophane, brun fauvâtre, lisse et brillant à marge striée - lames serrées roussâtres - stipe brun avec anneau - confusion possible avec K. mutabilis
Gomphus	clavatus		Chanterelle violette		chapeau retourné vers le haut, charnu, ochracé à reflets violets, à marge ondulée - plis fourchus décurrents - pied court
Ganoderma	carosum		Ganoderme du sapin		sur conifères - chapeau brillant brun rouge à brun noirâtre - hyménium blanchâtre devient brunâtre au toucher - stipe noir
Ganoderma	lipsiense		Ganoderme aplani		chapeau>15 plat, pores fins blancs : on peut dessiner dessous !
Gymnopilus	penetrans		Gymnopile pénétrant		chapeau et lames jaune rouillé - légère cortine - débris conifères surtout
Helvella	lacunosa		Helvelle lacuneuse		chapeau lobé ondulé gris sombre - stipe cylindrique profondément sillonné, creux, grisâtre
Helvella	macropus		Helvelle à long pied		coupe 3-5cm grisâtre surmontant un long pied - face externe et stipe duveteux
Hydnellum	concrescens		Hydne concrescens		chapeau cylindrique, rouge brun à vineux, zoné à marge blanche - aiguillons rose brun pâle
Hydnum	repandum		Pied de mouton		
Hydnum	rufescens		Pied de mouton roussissant		Différences avec H.repandum : + roux, + frêle, aiguillons non décurrents
Hydropus	marginellus		Mycène à lames marginées		lames blanchâtres à arête brune - chapeau ombiliqué brunâtre à marge striée plus claire
Hygrocybe	psittacina		Hygrophore perroquet		prairies pauvres - couleurs bariolées de vert, jaune, rougeâtre - visqueux - lames jaunes ou verdâtres
Hygrophorus	cosus		Hygrophore à odeur de cosus (chenille)		odeur de cosus ou topinambour - entièrement blanc - visqueux
Hygrophorus	eburneus		Hygrophore ivoire		odeur de mandarine - couleur blanc ivoire - très visqueux - + élance que H.cosus - stipe atténué à la base
Hypholoma	fasciculare		Hypholome en touffe	+++	en touffes - chapeau jaune vif - lames sulfurines puis verdâtres - stipe cortiné, jaune soufre, roux à la base
Inocybe	exiguipora				
Inocybe	geophylla	lilacina	Inocybe lilas à lames terreuses		chapeau mamelonné violacé clair à centre jaunâtre - odeur spermatique - pied fibreux concolore
Kuehneromyces	mutabilis		Pholiote changeante		différences avec Galerina marginata : en touffes - stipe chaussé d'une armille floconneuse jusqu'à l'anneau
Laccaria	amethystina		Laccaire améthyste	++	tout violet
Lactarius	blennius		Lactaire muqueux		sous hêtre - très visqueux - chapeau gris verdâtre taché - lait blanc puis verdâtre - saveur amère
Lactarius	determinus		Lactaire de l'épicea (détectable)		sous épicéa - stipe avec ceinture blanche sous les lames - chair et lait orangés puis rougissant lentement
Lactarius	fuliginosus		Lactaire enfumé		chapeau brun grisâtre à café au lait - lames et stipe crème ochracé - chair rosissant lentement - lait blanc
Lactarius	pallidus		Lactaire pâle		sous hêtre - visqueux - chapeau crème rosâtre à beige - lames et stipe blanchâtres - lait blanc légèrement acre
Lactarius	piperatus		Lactaire poivré		chapeau blanc crème, en entonnoir, à marge enroulée - lames décurrentes crème - chair et lait blancs et âcres
Lactarius	salmonicolor		Lactaire couleur saumon		sous sapins - chapeau ochracé ou orangé pâle - stipe concolore scrobiculé - chair et lait orangés devenant rougeâtres - saveur amère
Lactarius	scrobiculatus		Lactaire scrobiculé		sous conifères - stipe court scrobiculé de jaunâtre - gros chapeau ochracé roussâtre à marge enroulée barbu - chair et lait jaunissants - saveur âcre
Lactarius	volemus		Lactaire à lait abondant = Vachotte		chapeau 10-15cm brun-orangé - lait abondant - odeur de topinambour puis de hareng
Laetiporus	sulphureus		Polypore soufré		gros chapeaux orangé vif, imbriqués et allongés en forme de langues
Lentinellus	cochleatus		Lentin en colimaçon		chapeaux en forme de cornet brun roussâtre - lames très décurrentes sur stipe en gouttière - stipes soudés à la base - odeur anisée
Lepiota	cristata		Lépiote crêtée		petit chapeau blanc à calotte brun clair, parsemé d'écailles ocre roussâtre - stipe à base vineuse - odeur de caoutchouc
Lepiota	ignivolvata		Lépiote à base rouge		stipe à base rosissante avec anneaux obliques en forme de guirlandes - chapeau à calotte brun chatain et squames piléiques beige pâle - odeur de caoutchouc
Lepiota	ochraceosulfureus				chapeau à squames ochracés et disque plus sombre - stipe cotonneux, jaunissant au frottement
Lepiota	ventriospora		Lépiote à spores ventrués		chapeau à marge laineuse jaune vif - stipe à flocons jaune vif

Lenzites	betulina		Lenzite du bouleau		l'un des rare polypore à lames
Lycoperdon	perlatum		Vesse-de-loup perlée		carpophore en massue blanc - chapeau recouvert de courtes bosses épineuses (perles) - stipe peu marqué
Macrolepiota	procera		Lépiote élevée = Coulemelle		squames circulaires régulières beige ochracé sur fond pâle - chair pâle immuable
Marasmiellus	candidus		Marasme candide		en groupe - entièrement blanc - chapeau gaufré à lames espacées, mal formées et interveinées
Marasmius	alliaceus		Marasme à odeur d'ail		odeur d'ail - stipe long noirâtre
Megacollybia	platyphylla	+++	Collybie à larges feuilletts		chapeau fibreux - lames très larges - longues "racines" au pied
Mycena	haematopus		Mycène à pied rouge		chapeau campanulé brun roussâtre à rosâtre - lames blanches à reflets rose - stipe pruneux avec lait rouge vineux à la coupe
Mycena	metata		Mycène conique		chapeau très strié brun rosâtre - stipe filiforme - odeur iodée en séchant
Mycena	pelianthina		Mycène gris violet		chapeau lames et pied gris violacé ou lilacin - odeur forte de radis
Mycena	pura		Mycène pure		violet rose lilas - odeur de rave
Mycena	pura	alba	Mycène pure var. blanche		chapeau crème à marge blanchâtre translucide - odeur de rave
Mycena	renatii		Mycène à pied jaune		chapeau rose, pied jaune, légère odeur radis, en touffes
Mycena	rosea	++	Mycène rose		entièrement rosée - charnue - stipe épais à la base
Peziza	saniosa				en petits groupes - de couleur gris bleu foncé - lait bleu à la cassure
Pholiota	astragalina		Pholiote astragale		sur conifères - chapeau orangé abricot - stipe à base fauvâtre - lames et chair à reflets saumonés
Pholiota	cerifera		Pholiote dorée		en touffes - chapeau jaune visqueux à squames roussâtres - lames jaunes - stipe à fibrilles hérissées
Pleurocybella	porrigens		Pleurote en oreille		sur conifères - chapeaux blancs, imbriqués, plats - lames blanches serrées et molles - chair mince, élastique
Pluteus	chrysophaeus		Plutée jaune		chapeau jaune brunâtre à ochracé - stipe crème, poilu
Pluteus	leoninus		Plutée couleur de lion		chapeau jaune vif à reflets olivâtres - lames rosées - stipe jaunâtre
Pluteus	phlebophorus		Plutée veiné		chapeau brun veiné - lames rosâtres - stipe blanc strié
Polyporus	durus		Polypore bai ou à pied noir		chapeau >20, brun roux, charnu, stipe latéral ou excentré à base noire
Porphyrellus	porphyrosporus		Bolet à spores pourpres (porphyre)		chapeau mat, brun sombre à gris olivâtre - pied concolore - tubes marron grisâtre - bleuissement au toucher et à la coupe
Pseudocraterellus	cinereus		Chanterelle cendrée		Différences avec C. cornucopioides (trompette) : plis lamelliformes bien marqués, ramifiés, nettement décurrents - stipe plein - odeur fruitée
Pycnoporus	cinnabarinus		Tramète rouge cinabre		le rouge du cerisier
Ramicola	sumptuosa		Simocye somptueux		chapeau brun velouté - lames concolores, espacées - stipe beige pruneux, à base blanche
Ramaria	botrytis		Clavaire chou-fleur		tronc épais blanchâtre - rameaux sommitaux courts terminés par des pointes rosâtres
Ramaria	formosa		Clavaire élégante (jolie)		rameaux allongés, rose orangé saumoné, à extrémités jaunes - chair blanc rosâtre à vineuse
Rhodocollybia	butyracea		Collybie beurrée		chapeau à mamelon gras (beurré) - stipe à base épaissie et striée
Rickenella	fibula		Omphale épingle		orangé - petit chapeau 0,5 à 1cm - pied fin
Rugosomyces	chrysenteron		Calocybe à chair jaune		tout jaune - odeur farineuse - saveur amarescente
Russula	albonigra		Russule blanche et noire		lames peu serrées, noircissante, saveur mentholée
Russula	aurea		Russule dorée		rouge jaunissant en doré - chair et lames jaune vif
Russula	cavipes		Russule à pied creux		stipe creux jaunissant à la base - odeur de compote de pomme - saveur âcre
Russula	fageticola		Russule du hêtre		chapeau à cuticule rouge vermillon, séparable avec chair rosée en dessous - odeur un peu noix de coco - saveur âcre
Russula	foetens		Russule fétide		odeur fétide - gros chapeau roussâtre d'abord globuleux (comme un jeune cône) - lames crème sale
Russula	illota		Russule mal lavée (à arêtes ponctuées)		voisine de R.laurocerasi mais arête des lames piquetée de brun rouille et pied blanchâtre également piqueté de noirâtre
Russula	integra		Russule intégrale		sous conifères - chapeau charnu, brun jaunâtre - lames jaune - stipe blanc puis ochracé - saveur de noisette puis de papier maché
Russula	mustelina		Russule belette		chapeau convexe et charnu, brunâtre - lames crème à ochracé - stipe trapu blanchâtre
Russula	ochroleuca		Russule ocre et blanc		chapeau ocre jaune + vif - lames blanches - saveur peu âcre
Russula	puellaris		Russule fillette ou candide ou jaunissante		la jaunissante
Russula	turci		Russule cocardée		chapeau pourpre avec cocarde centrale plus foncée - lames jaunes - odeur d'iode à la base du stipe - sous conifères
Russula	vesca		Russule vieux-rose		couleur jambon - cuticule séparable rétractée à la marge "habillée trop court"
Sparassis	laminosa		Sparassis à lames		sous feuillus - odeur d'eau de javel - voisin de S.crispa (sous conifères)
Stereum	hirsutum		Stérée hirsute		le plus poilu
Trametes	hirsuta		Tramète hirsute		chapeau couvert de poils brillants, hirsutes, blanc crème, gris, beige, pores ronds blanchâtres
Trametes	versicolor		Polypore versicolore		le bariolé, très fin, en troupes
Tricholoma	pseudonictitans		Tricholome luisant		sous conifères - chapeau brun souvent visqueux, à marge lisse - stipe jaunâtre au grattage - lames ocre jaunâtre
Tricholoma	sejunctum		Tricholome disjoint		chapeau mamelonné, fibrillé, jaune verdâtre plus foncé au centre - lames blanchâtres - stipe lavé de jaune - odeur farineuse - saveur amarescente
Tricholomopsis	rutilans		Tricholome rutilant		sur confères - chapeau jaune moucheté de fines écailles purpurines - stipe et lames jaunes
Xerocomus	badius		Bolet bai		chapeau bai marron vif - stipe rayé de roussâtre - pores crème jaunâtre bleuissement à la pression
Xerocomus	chrysenteron	+++	Bolet à chair jaune		chapeau craquelé, sec avec sous-cuticule rouge - tubes jaune olive bleuissement au toucher
Xerula	radicata		Collybie radicante		chapeau mamelonné visqueux - stipe allongé prolongé par une fausse racine