

RECOLTE ISSAUX - LOURDIOS le 20/07/2014

GENRE	ESPECE	NOM VERNACULAIRE	OBSERVATIONS	DESRIPTIF
Agrocybe	firma	Agrocybe velouté		chapeau brun jaune - stipe entièrement pruineux - odeur farineuse
Amanita	excelsa	Amanite élevée		chapeau brun foncé parsemé de traces vélares grisâtres-anneau tenace - stipe à base bulbeuse - odeur de rave
Amanita	rubescens	Amanite rougissante = vineuse = Golmotte		chapeau brun rosé ponctué de restes vélares - lames et stipe tachés de rose vineux - chair rougit aux blessures
Amanita	spissa	Amanite épaisse		chapeau brun foncé parsemé de traces vélares grisâtres-anneau strié, tenace - stipe à base bulbeuse - odeur de rave
Amanita	umbrinolutea	Amanite à cerne sombre		la "battarae" des montagnes, marge des lames grise - pas d'anneau
Amanita	vaginata	Amanite vaginée		chapeau gris, lisse à marge striée - pas d'anneau - stipe creux - volve engageante
Astraeus	hygrometricus	Astrée hygrométrique		étoile de 6 à 8 branches se refermant par temps sec
Boletus	aestivalis	Cèpe d'été		ressemble à B.edulis mais chapeau à revêtement mat - stipe entièrement réticulé de blanchâtre sur fond roussâtre
Boletus	calopus	Bolet à beau pied		chapeau blanchâtre - pores jaune vif nettement bleuissants - stipe réticulé jaune en haut et rouge en bas - chair amère
Boletus	edulis	Cèpe de Bordeaux		chapeau à revêtement un peu lubrifié avec liseré blanchâtre à la marge - stipe peu réticulé
Boletus	luridus	Bolet blafard		ressemble à B.erythropus mais stipe réticulé avec chair un peu vineuse à la base
Cantharellus	amethysteus	Girolle améthyste		girolle à reflets violets (squames) sur le chapeau
Cantharellus	friesii	Girolle abricot		petite girolle à couleurs vives (rouge rosé) - odeur d'abricot
Cantharellus	subpruinosis	Girolle presque pruineuse		chapeau charnu, à marge enroulée, recouvert d'une fine pruine blanchâtre - pied trapu pruineux - chair blanchâtre
Clathrus	ruber	Clathrus rouge		en forme de cage grillagée de couleur rouge corail - odeur fétide
Clitocybe	gibba	Clitocybe en entonnoir		chapeau en entonnoir - odeur de flouze ou cyanique
Collybia	aqueosa	Collybie aqueuse	+++	stipe bulbeux - mycélium rosâtre (différences avec C.dryophila)
Collybia	confluens	Collybie confluyente		en touffes - lames très serrées blanchâtres - stipe typique sillonné ou comprimé à pruine gris lilas - odeur coumarine
Cortinarius	hinnuleus	Cortinaire couleur de faon		chapeau mammelonné "couleur de faon" hygrophane - lames espacées concolores - stipe avec anneau médian blanc membraneux - odeur forte terreuse
Cortinarius	rubicundulus	Cortinaire rubicond		Intense jaunissement de la chair à la coupe !
Crepidotus	applanatus	Crepidote aplani		ne se pèle pas facilement (dif. de mollis)
Echinoderma	asperum	Lépiote à lames fourchues		chapeau avec écailles pointues - lames fourchues - stipe un peu bulbeux avec anneau - odeur de caoutchouc
Entoloma	allochromum			chapeau mammelonné brun violacé avec aspérités - stipeavec fibrilles violacées
Entoloma	rusticoides	Entolome campagnard		chapeau fortement ombiliqué brun foncé strié - lames très espacées, brunes, décurrentes
Fomes	fomentarius	Amadouvier		en forme de sabot de cheval - pores gris très fins
Fuligo	septica	Fleur de tan		myxomycète de couleur jaune soufre
Galerina	marginata	Galère marginée		chapeau hygrophane, brun fauvâtre, lisse et brillant à marge striée - lames serrées roussâtres - stipe brun avec anneau - confusion possible avec K. mutabilis
Ganoderma	lipsiense	Ganoderme aplani		chapeau>15 plat, pores fins blancs : on peut dessiner dessous !
Hydnum	repandum	Pied de mouton		
Hymenochaete	corrugata			croûte brun-rose envahissant les branches de noisetiers ; soies visibles à la loupe
Inocybe	asterospora	Inocybe à spores étoilées		chapeau mammelonné fibrilleux - stipe pruineux et bulbeux - spores en forme d'étoiles
Inocybe	fibrosoides			chapeau mammelonné fibrilleux beige - stipe bulbeux
Inocybe	velenovskyi			
Kuehneromyces	mutabilis	Pholiote changeante		différences avec Galerina marginata : en touffes - stipe chaussé d'une armille floconneuse jusqu'à l'anneau
Lactarius	quietus	Lactaire tranquille		chapeau zoné brun-roux - stipe brun plus foncé à la base - odeur de punaise ou lingé mouillé
Lactarius	volemus	Lactaire à lait abondant = Vachotte		chapeau 10-15cm brun-orangé - lait abondant - odeur de topinambour puis de hareng
Leccinum	duriusculum	Bolet des peupliers		sous peupliers - chapeau grisâtre sublisse - stipe légèrement ventru, subréticulé
Leccinum	scabrum	Bolet rude		chapeau brunâtre - pied à mèches noires - chair immuable
Lentinus	conchatus	Lentin coquillage		sur souches, souvent en touffes - chapeau, lames et stipe ochracés à reflets violets - pied court souvent excentré
Lepiota	ochraceosulfurescens			chapeau à squames ochracés et disque plus sombre - stipe cotonneux, jaunissant au frottement
Lepiota	ventriosospora	Lépiote à spores ventruées		chapeau à marge laineuse jaune vif - stipe à flocons jaune vif
Limacella	vinosorubescens	Limacelle vineuse		chapeau visqueux rose vineux - anneau rosâtre - stipe marbré de rosâtre
Marasmius	alliaceus	Marasme à odeur d'ail		odeur d'ail - stipe long noirâtre
Marasmius	rotula	Marasme petite roue		marge très festonnée, en parachute
Megacollybia	platyphylla	Collybie à larges feuilletés	++	chapeau fibrilleux - lames très larges - longues "racines" au pied
Mycena	pellianthina	Mycène gris violet		chapeau lames et pied gris violacé ou lilacin - odeur forte de radis
Mycena	pura	Mycène pure		violet rose lilas - odeur de rave
Mycena	pura var. ianthina			se distingue de M.pura par son chapeau bleu clair lavé de violet ou gris bleuâtre - stipe concolore
Mycena	rosea	Mycène rose		entièrement rosée - charnue - stipe épaissi à la base
Oligoporus	caesius	Polypore bleuté		sur bois pourri - chapeau duveteux à reflets bleutés - pores fins blancs à reflets bleutés
Oudemansiella	mucida	Mucidule visqueuse	++	blanc, visqueux, annelé, sur hêtre
Peziza	succosa	Pézize à lait jaune		lait jaunissant à la cassure
Phallus	impudicus	Satyre puant		
Phylloporus	pelletieri (rhodoxanthus)			chapeau sec brunâtre - pores jaune vif, allongés, lamelliformes
Pluteus	cervinus	Plutée couleur de cerf		odeur de rave ; chapeau fauve à brunâtre plus foncé au centre
Pluteus	luteovirens	Plutée jaune verdâtre		chapeau jaune citrin à jaune verdâtre
Polyporus	ciliatus	Polypore cilié		chapeau 4-8cm grisâtre à brun jaunâtre, stipe chiné, pores fins
Polyporus	durus	Polypore bai ou à pied noir		chapeau >20, brun roux, charnu, stipe latéral ou excentré à base noire
Polyporus	tuberaster			chapeau 3-6cm circulaire, squames en pointes, stipe assez central
Psathyrella	gossypina	Agaric cotonneux		chapeau couvert de restes vélares-pied fibrilleux et floconneux-cystides à inclusion huileuse
Pycnoporus	cinnabarinus	Tramète rouge cinabre		le rouge du cerisier
Russula	albonigra	Russule blanche et noire		lames peu serrées, noirissante, saveur mentholée
Russula	aurea	Russule dorée		rouge jaunissant en doré - chair et lames jaune vif
Russula	cyanoxantha	Russule charbonnière		chapeau à couleurs variées - lames blanches "lardacées" - saveur douce

Russula	integra	Russule intègre		sous conifères - chapeau brun jaunâtre - lames jaunes - saveur de noisette
Russula	laurocerasi	Russule laurier cerise		chapeau roussâtre - lames blanches - odeur forte de laurier cerise ou amande amère
Russula	ochroleuca	Russule ocre et blanc		chapeau ocre jaune +- vif - lames blanches - saveur peu âcre
<b>Russula</b>	<b>solaris</b>	<b>Russule solaire</b>		piquante, jaune, centre jaune d'oeuf
Stereum	hirsutum	Stérée hirsute		le plus poilu
Stereum	insignitum	Stérée remarquable		sur souches, troncs - chapeau en éventail rouge à ocre plus clair à la marge
Stropharia	semiglobata	Strophaire hémisphérique		sur bouses ou crottins, chapeau hémisphérique visqueux, stipe à anneau médian membraneux
Trametes	hirsuta	Tramète hirsute		chapeau couvert de poils brillants, hirsutes, blanc crème, gris, beige, pores ronds blanchâtres
Trametes	versicolor	Polypore versicolore		le bariolé, très fin, en troupes
Xerocomus	armeniacus	Bolet abricot		base stipe orangée
Xerocomus	chrysenteron	Bolet à chair jaune	+	chapeau craquelé, sec avec sous-cuticule rouge - tubes jaune olive bleuissants au toucher
Xerula	radicata	Collybie radicante		chapeau mamelonné visqueux - stipe allongé prolongé par une fausse racine

TOTAL = 76 espèces récoltées dont 12 espèces sur les 22 de la liste établie en préparation de la sortie